第22卷　第4期　　植　物　研　究　　2002年　10月
Vol. 22　No.4　　BULLETIN OF BOTANICAL RESEARCH　　Oct.,　2002

中国繁缕(*Stellaria chinensis* Regel)一新变种*

朱长山[1]　李贺敏[1]　许永安[2]

(1. 河南农业大学, 郑州　450002)
(2. 周口职业技术学院, 周口　466001)

摘　要　发表了中国繁缕一新变种, 即缘毛中国繁缕 *Stellaria chinensis* Regel var. *ciliata* C.S. Zhu et H.M.Li.

关键词　繁缕属; 缘毛中国繁缕; 新变种

A NEW VARIETY OF *STELLARIA CHINENSIS* REGEL

ZHU Chang—shan[1]　LI He—min[1]　XU Yong—an[2]

(1. Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002)
(2. Zhoukou Vocational—technical College, Zhoukou 466001)

Abstract　A new variety (*Stellaria chinensis* Regel var. *ciliata* C.S. Zhu et H.M. Li.) from Henan Province is given.

Key words　*Stellaria* L.; *Stellaria chinensis* Regel var. *ciliata* C.S.Zhu et H.M Li; new variety.

缘毛中国繁缕　新变种

Stellaria chinensis Regel var. ***ciliata*** C. S. Zhuet H.M. Li, var. nov.

A var. chinensi differt foliis subtus ad costam dense pilosis, margine cum margine petiorum dense ciliatis; ramis juventis pedunculis pedicellisque plus minusve pilosis, gradatim decalvatis.

Henan(河南): Neixiang(内乡), Baotianman(宝天曼), alt. 1250 m, in pratis clivorum et ad margines sylvarum, 1986—08—23, Wang Dong—yi(王冬毅) 86495 (Hicdesignatus HNAC); Luanchuan(栾川), Laojunshan(老君山), alt. 1050m, 1990—07—20, Zhu Changshan(朱长山) et Xu Yong—an (许永安) 90136. 90137 (HNAC).

本变种与原变种不同在于: 叶片下面沿中脉密被柔毛, 叶缘全部及叶柄两侧边缘密被缘毛; 幼茎连同花序梗, 花梗或多或少被柔毛, 后脱落变无毛。

---

* 第一作者简介: 朱长山(1945—), 男, 教授, 主要从事种子植物分类学教学与科研。

收稿日期: 2002—05—29